

IMPLANTACIÓN DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON Y RECTO EN POVISA HOSPITAL

**Climent, Antonio; Estévez, Alfredo; Varela, Araceli; Toscano, Alberto; Lozano, Manuel; Toscano, Ernesto
POVISA Hospital, Vigo**

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Cirugía laparoscópica se impone en la cirugía colorrectal tras la evidencia científica de su utilidad y aplicabilidad. La implantación en nuestro Servicio se basa en la monitorización de nuestros resultados y la comparación con los obtenidos en la vía laparotómica y en las series de otros Servicios.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el período de tiempo comprendido entre el año 2003 y el 2007 hemos realizado 59 intervenciones de colon y recto por vía laparoscópica. 50 de ellas (85%) por patología maligna y 9 (15%) por patología benigna. La edad media de nuestros pacientes fue de 65 años. De ellos, 26 son varones y 33 mujeres. La distribución por patología benigna fue de seis diverticulitis, un vólvulo de sigma, una angiodisplasia de colon derecho y una fístula colobronquial. La patología maligna fue de 17 neoplasias de colon derecho (hemicolecotomías derechas), 7 neoplasias de colon descendente (hemicolecotomías izquierdas), 10 neoplasias de sigma (sigmoidectomías), 10 neoplasias de recto medio y alto (resección anterior de recto baja), 4 casos de recto bajo (Miles) y dos casos irresecables por carcinomatosis (By-pass). El índice de conversión fue del 8,4%. Tiempo operatorio 183 min. Estancia media 6,5. Morbilidad 15 pacientes (35%). Mortalidad 2 pacientes (3,5%).

CONCLUSIONES

Los datos de nuestra serie nos permiten continuar la línea de implantación de la cirugía laparoscópica colorrectal en nuestro Servicio. Estos resultados son producto de la especialización de nuestra Sección de Coloproctología.