

ENTERITIS RÁDICA

M^a Isabel Pérez Moreiras

Servicio de Cirugía del Hospital Xeral Calde de Lugo

INTRODUCCIÓN

La radioterapia es una de las modalidades terapéuticas más importantes a la hora de tratar neoplasias malignas, pero el incremento de su uso, trae consigo el aumento de la incidencia de sus complicaciones. Se encuentra entre ellas la enteritis radica, que cada vez se con mayor frecuencia en nuestros hospitales, a consecuencia de la aplicación de radioterapia sobre abdomen y pelvis. Esta comunicación presenta una revisión de a enteritis r dica, junto con la caus stica en nuestro hospital en los  ltimos 6 a os.

MATERIAL Y M TODOS

Entre el a o 2000 y el 2006, se han revisado las historias cl nicas de los pacientes ingresados en nuestro hospital tanto en el servicio de digestivo como en el de Cirug a General, con el diagn stico de la enteritis r dica. Se recogieron las siguientes variables cl nicas: sexo, edad, n mero de casos por edad, enteritis aguda o cr nica, sintomatolog a, forma de diagn stico, modalidad de tratamiento, n mero de ingresos y evoluci n posterior. Se realiza un b squeda de literatura sobre el tema utilizando MEDLINE.

RESULTADOS

Entre los a os 2000 y 2006, fueron 24 los pacientes ingresados con el diagn stico enteritis r dica con edad media de 68 a os (31-88). Siendo el 62,5% hombres. Solo 2 de los casos eran Enteritis Aguda, siendo el resto de los cuadros cr nicos. El s ntoma predominante m s frecuente fue la rectoragia. Los dos cuadros agudos presentaban suboclusi n uno, y diarrea el otro. En lo que respecta al manejo, fueron 11 los pacientes que recibieron solo tratamiento m dico, otros 11 tratamiento endosc pico, y s lo 2 precisaron tratamiento quir rgico, colostom a en ambos.

Solamente un paciente preciso m s de tres ingresos, y 16, s lo ingresaron 1 vez en el transcurso de 6 a os. En cuanto a la evoluci n posterior, s lo 1 fue dado de alta, fallecieron 8, pero s lo 1 de ellos a motivo de la enteritis r dica, siendo uno de los pacientes intervenidos. El resto (15) est n en seguimiento.

CONCLUSIONES

Aunque si se ve un incremento de los ingresos debidos a esta patolog a a lo largo de los a os, hay que tener en cuenta, que posiblemente se trate de una incidencia infraestimada, pues se nos escapan todos los casos que no precisan ingreso, o todos aquellos leves, por los que los pacientes no llegan a consultar. Se observa un incremento del n mero de ingresos a medida que pasan los a os, correspondiendo el mayor n mero de ingresos a los pacientes de mayor edad en nuestra muestra se ve una mayor incidencia en los hombres, lo que puede estar en relaci n con la radioterapia recibida por el c ncer de pr stata, que fue el motivo de radioterapia que se observ  con mayor frecuencia. Vemos que se trata de una patolog a progresiva, con poca tendencia hacia la curaci n, requiriendo seguimiento y la aplicaci n de m ltiples tratamientos as  como de m ltiples ingresos, siendo la cirug a el  ltimo escal n, dentro del manejo terap utico.