

# **LINFANGIOMA QUÍSTICO ABDOMINAL**

**ALVITE CANOSA, MARLÉN; ALONSO FERNÁNDEZ, LETICIA; SEOANE VIGO, MARTA; LÓPEZ GARCÍA, SARA; PÉREZ GROBAS, JORGE; BERDEAL DÍAZ, MARÍA; FERNÁNDEZ BLANCO, CELSA; GÓMEZ FREIJOSO, CARLOS**  
**CHU JUAN CANALEJO. La Coruña**

## **INTRODUCCIÓN**

Los linfangiomas son un grupo poco frecuente de tumores benignos de los vasos linfáticos. Propios de la infancia, el 40% se diagnostican en el primer año de vida y el 80% antes de los 6 años. Se presentan generalmente en la región de cabeza y cuello. Menos del 5% son intraabdominales.

Presentamos el caso de un linfangioma quístico abdominal en una joven de 16 años.

## **MATERIAL Y MÉTODOS**

Mujer de 16 años sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de amigdalectomía. Acude a urgencias por dolor lumbar izquierdo cólico de dos días de evolución, sin náuseas ni vómitos, no síndrome febril o miccional ni alteración del hábito intestinal. El abdomen es blando, depresible, con molestias a la palpación profunda en hemiabdomen izquierdo sin defensa ni datos de peritonismo. Los análisis de sangre y orina son normales. La ecografía demuestra una gran masa quística en hipocondrio izquierdo con septos en su interior sugestiva de linfangioma.

## **RESULTADOS**

El TAC abdominal evidencia la masa quística que se extiende por epigastrio e hipocondrio izquierdo de unos 8-10 cm que engloba el estómago y contacta con el bazo y el lóbulo hepático izquierdo, compatible con linfangioma quístico.

En la intervención quirúrgica se aprecia una gran masa quística de aproximadamente 12 cm de diámetro máximo, de paredes muy finas y con adherencias laxas a curvatura menor gástrica y lóbulo hepático izquierdo. Se realiza exéresis de la masa liberando las adherencias a estructuras vecinas y con apertura accidental de la misma aspirándose 1,5 litros de contenido seroso.

Presenta evolución favorable durante el postoperatorio siendo dada de alta al séptimo día.

El estudio histopatológico confirmó que se trataba de un linfangioma quístico.

## **CONCLUSIONES**

El linfangioma es un tumor benigno de los vasos linfáticos, poco frecuente y propio de la infancia. Menos del 5% son intraabdominales.

No produce un cuadro clínico típico, a veces los síntomas se deben a la presencia de la masa quística abdominal, que al crecer puede comprimir estructuras adyacentes y provocan obstrucción intestinal, desplazamiento de riñones, uréteres o de la vascularización abdominal.

Otras veces los síntomas se deben a las complicaciones como torsión del quiste o ruptura del mismo, con o sin infección secundaria y peritonitis.

El pronóstico es bueno si la resección quirúrgica es completa, pero puede recidivar si la resección es incompleta, lo que ocurre con mayor frecuencia en los linfangiomas que comprometen la raíz del mesenterio.