

INVAGINACIÓN YEYUNOILEAL EN EL ADULTO POR LIPOMATOSIS INTESTINAL

HOSPITAL DO MEIXOEIRO

GALAN, LOURDES (1); JOVE, PATRICIA (1); GARCÍA, MARIA TERESA (1); GAY, ANA MARIA (1); MARTÍNEZ, MARTA (1); LOJO, JOSE LUIS (1); CASAL, JOSE ENRIQUE (1)

INTRODUCCIÓN

La invaginación intestinal (II) es una entidad rara en el adulto, siendo predominante la localización colónica. Supone aproximadamente el 5% de las causas de oclusión en el adulto. La existencia de procesos neoformativos en la luz del intestino favorece esta patología.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos el caso de un paciente de 42 años con antecedentes de laparotomía por herida de arma blanca, que acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal cólico intenso, localizado en epigastrio y acompañado de vómitos. La analítica presenta leucocitosis con desviación izquierda y la radiografía de abdomen muestra dilatación de asas de ID. El TC abdomino-pélvico informa de invaginación intestinal, por lo que es intervenido. Se evidencia un ID con múltiples tumoraciones, una II como causa de oclusión y como cabeza de la invaginación un lipoma.

RESULTADOS

Realizamos resección del intestino afecto. La Anatomía Patológica informa de poliposis lipomatosa de ID.

CONCLUSIONES

Los lipomas son los tumores benignos más frecuentes del intestino delgado (ID), sin embargo la lipomatosis intestinal es extremadamente infrecuente. Los lipomas están confinados generalmente a la submucosa, pudiendo extenderse a la serosa y a la grasa mesentérica, respetando la muscularis propia. Afecta frecuentemente al íleon, aunque hay casos en los que es generalizada. La clínica está determinada por la obstrucción, y en menor medida por pérdidas hemáticas. El tratamiento consiste en una resección quirúrgica del área afectada.