

Cirugía Bariátrica en el Hospital Meixoeiro de Vigo

Hospital Meixoeiro de Vigo (CHUVI)

Martínez Miguez, Marta (1); Maruri Chimeno, Ignacio (1); Otero Martínez, Isabel (1); García Martínez, María Teresa (1); Jove Albores, Patricia (1); Galan Raposo, Lourdes (1); Gay Fernández, Ana María (1); Ruano Poblador, Alejandro (1); Morales Gorria, Maaría José (1); Delgado Calvete, Carlos (1); Casal Nuñez, Jose Enrique (1)

Introducción: se analizan los resultados generales de la cirugía bariátrica en nuestro hospital.

Material y métodos: estudio retrospectivo de las historias clínicas de 187 pacientes.

Resultados: se intervienen 187 pacientes con obesidad mórbida (15% varones y 85% mujeres) con edad media de 39 años (18-64), entre marzo de 1997 a diciembre de 2007.

Se realizan 64 cruces duodenales (CD) (34,2%), 117 bypass gástricos (67,6%) 85 laparoscópicos (72,6%), 4 bypass de una anastomosis (BGUA) (2,1%), 1 sleeve (0,5%) y una gastroplastia vertical (0,5%).

El peso medio fue 130 Kg (84-204) y el IMC medio 49,5 (36-72). ASA 2: 62,6% y ASA 3: 37,4%. Presentaban comorbilidades 80,2%: HTA 46%, diabetes 17,6%, dislipemia 14%, ansiedad/depresión 18%, artropatías 38,5%, síndrome varicoso 26,2%, SAOS 27,8%, amenorrea 11%.

Precisaron ingreso para ayuno previo a la cirugía 5,3% y se recurrió al balón intragástrico previo en otro 5,3%.

La morbilidad postoperatoria fue de 7,4%: colección intraabdominal 1,6%, obstrucción intestinal 2,6%, hemorragia digestiva 2,7%, fístula 0,5%. Morbilidad media: fibrilación auricular 0,5%, TEP 1%, pancreatitis aguda 1,6%. No existe mortalidad operatoria.

Se reintervinieron por pérdida de peso inferior al 50%, 1,6% (gastroplastia vertical a CD, regastrectomía y asa común mas corta en otro CD).

Tres pacientes presentaron estenosis de la anastomosis gastroyeyunal que se resolvieron con dilataciones endoscópicas.

Conclusiones: La obesidad mórbida es una patología creciente en nuestro medio y se asocia a comorbilidades múltiples, que se solucionan total o parcialmente mediante la cirugía bariátrica. La vía laparoscópica simplifica el proceso para los pacientes y reduce las complicaciones derivadas de la laparotomía.

Nuestros resultados cumplen los estándares de calidad.