

HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMÁTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela (1)

Martínez Lesquereux, Lucía (1); Parada, Purificación (1); Puñal, José Antonio (1); Martínez, Jorge Juan (1); Beiras, Carolina (1); Gamborino, Elena (1); Álvarez, Rosa (1); Barreiro, Francisco (1); Beiras, Alejandro (1)

Introducción

La hernia diafragmática traumática es una entidad poco frecuente que comúnmente se desarrolla tras traumatismos cerrados.

Caso clínico

Mujer de 27 años que acude al Servicio de Urgencias de nuestro centro por epigastralgia de más de un año de evolución. La paciente ya había consultado en 5 ocasiones anteriores por esta misma sintomatología. Refiere haber sufrido un traumatismo banal hace 2 años. Al ingreso la paciente impresiona de afectada, intenso dolor anivel de hipocondrio izquierdo que aumenta con la palpación a ese nivel. En Rx de tórax destaca a nivel de hemidiafragma derecho opacidad que ocupa la mitad del hemotórax. Se realiza TC torazo-abdominal en que se objetiva situación intratorácica de colon y asas de intestino delgado. Con diagnóstico de hernia diafragmática derecha postraumática se decide ingreso e intervención quirúrgica a través de abordaje torácico, por toracotomía derecha. Se practica cierre del defecto antero-lateral del diafragma con sutura no absorbible. Dado que el defecto herniario era relativamente pequeño no fue necesario colocación de malla para cierre del mismo. No se evidenció saco herniario. La evolución clínica de la paciente fue muy favorable. La paciente es alta hospitalaria al 7 día de la intervención quirúrgica.

Discusión

El diagnóstico de la hernia diafragmática constituye un gran desafío, con relativa frecuencia se omite en fase aguda, lo que aumenta el riesgo de complicaciones tardías como estrangulación de las vísceras y necrosis.