

CO-8: ULTIMOS 50 CASOS DE CÁNCER DE VESÍCULA EN EL "H. U. 12 DE OCTUBRE". NUESTRA EXPERIENCIA

AUTOR/ES: Iago Justo Alonso; Sergio Pedro Olivares Pizarro; Alejandro Manrique Municio; Felix Cambra Molero; Alvaro Garcia-Sesma; Jorge Calvo Pulido; Rosmery Lopez Sterup; Carlos Jimenez Romero

INSTITUCIÓN: H. U. 12 de Octubre

INTRODUCCIÓN

El cáncer de vesícula representa una patología tan infrecuente como letal, diagnosticándose menos de 5000 casos en USA al año, la mayoría de forma incidental tras colecistectomías encontrándose hasta en un 1-2% de los casos. Presenta gran variabilidad geográfica presentándose en mayor parte en nuestro medio a raíz de la inmigración sudamericana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza una revisión retrospectiva de los historiales clínicos de los 50 últimos pacientes ingresados con el diagnóstico de cáncer de vesícula en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Se han recopilado a través de la intranet y de las historias médicas de datos en relación a las características del paciente, exigiéndose diagnóstico anatomopatológico de cáncer vesicular.

RESULTADOS

Presentamos 50 casos de cáncer de vesícula recogidos entre 2004-2009, con una edad media de 72,67 años (SD 11,5) con un 68,5% de mujeres, con un diagnóstico preferente en servicios de cirugía 81,8 %, siendo intervenidas hasta un 59,6%. El diagnóstico ha sido incidental hasta e un 74% de los casos siendo la anatomía patológica más frecuente el de adenocarcinoma hasta 95,6%. La supervivencia media ha sido de 9 meses, siendo la supervivencia al año de un 28,3% de los pacientes, a los 3 del 17% y a los 5 del 5,8 %. Fallecieron un 36% de los pacientes en el primer ingreso. Solo se beneficiaron de una reintervención el 13,5% de los pacientes. Un 5,9 % de los paciente presentaron cáncer sincrónico, por cuanto que un 9,8% presentaron tumores metacrónicos. Clínicamente llama la atención que hasta un 24,5% se presentan como absceso hepático mandando la clínica inespecífica como anorexia (74%), dolor (70%), nauseas (72%), ictericia (51%), presentando colecistitis al diagnóstico o previo al mismo el 45% de los pacientes. Al diagnóstico el 57,7% de los pacientes presentaba un estadio T4 (T1 1,9%; T2 11,5%; T3 28,8%), encontrándose metástasis hasta en un 76,9% de los casos en todos ellos incluían hepáticas. El estadio Nevin de 5 encontramos el 76,7% de los pacientes

CONCLUSIONES

El cáncer de vesícula en nuestro medio resulta fatal en la gran mayoría de los casos con diagnósticos muy tardíos en la gran mayoría, no pudiéndose reintervenir, ni alargar la supervivencia en dichos casos.